

Số: /UBND-NN

Tân Hiệp, ngày tháng 04 năm 2024

V/v Hướng dẫn chăm sóc và phòng  
trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ  
xuân, cây ăn quả.

Kính gửi:

- Hội Nông dân xã;
- Đài truyền thanh;
- Các ông/bà trưởng, phó thôn.

Qua kết quả kiểm tra theo dõi của Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp và cán bộ chuyên môn. Hiện nay vải thiều sớm, vải thiều chính vụ, nhãn, cây có múi giai đoạn hoa - quả non; lúa xuân giai đoạn đẻ nhánh; cây rau màu giai đoạn phát triển thân lá. Trong thời gian qua thời tiết âm u, se lạnh, xen kẽ mưa phùn, nồm ẩm là điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây hại.

Để tập trung chăm sóc và phòng trừ có hiệu quả các đối tượng sâu, bệnh hại. UBND xã đề nghị cán bộ chuyên môn phối hợp với các ngành, đoàn thể, thôn tập trung tuyên truyền hướng dẫn các hộ sản xuất thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện tốt một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh hại như sau:

### 1. Biện pháp chăm sóc

- Đối với cây lúa: Tiến hành làm cỏ, tía dặm (nhất là diện tích lúa gieo sạ); điều chỉnh mực nước trong ruộng phù hợp và bón thúc kịp thời cân đối lượng NPK trên diện tích lúa cấy muộn để lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi.

- Đối với cây rau màu: Bổ sung đầy đủ, cân đối dinh dưỡng NPK kết hợp vun xới để cây sinh trưởng, phát triển;

- Đối với cây vải, nhãn: Tập trung các biện pháp chăm sóc, tưới nước đủ ẩm, vệ sinh vườn, cắt tỉa cành tăm, cành sâu bệnh, cành lộc nhằm giảm cạnh tranh dinh dưỡng, hạn chế lưu trú của sâu bệnh hại. Sau khi đậu quả non cần bổ sung cân đối phân bón NPK, phân qua lá có hàm lượng Bo cao để giảm tình trạng rụng quả.

- Đối với cây có múi: Tiến hành cắt tỉa cành tăm, cành vượt, lộc trong tán để giảm cạnh tranh dinh dưỡng; bón bổ sung cân đối phân NPK, phân qua lá Bo, Canxi, vi lượng... để hạn chế rụng quả non và dưỡng quả.

## **2. Biện pháp phòng trừ sâu, bệnh**

### **2.1. Trên lúa:**

Kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh đạo ôn lá, phòng trừ kịp thời khi bệnh mới phát sinh bằng thuốc Beam 75WP, Bump 650WP, Amistar Top 325 SC,...(đối với diện tích bị nhiễm bệnh đạo ôn lá nặng cần phun nhắc lại sau 3-5 ngày); trừ bệnh khô vằn bằng thuốc Anvil 5SC, Validacin 5SL...; trừ bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn bằng thuốc: Usagvil 250SC, Sucker 4SL, 90WP, Starner 20WP; Kiểm tra trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bọ trĩ... trên diện tích có mật độ cao bằng thuốc Tasieu 5WG, Aremec 45EC...; Diệt chuột bằng các biện pháp như: Dùng cạm, bẫy, sử dụng thuốc Linh Miêu 0,5WP...

### **2.2. Trên cây rau màu:**

- Đối với cây ngô: Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh hại đặc biệt là sâu keo mùa thu cần phòng trừ ở giai đoạn sâu non bằng một trong các loại thuốc như: Voliam targo<sup>®</sup> 063SC, Radiant 60SC; phòng trừ bệnh khô vằn, đốm lá bằng thuốc Anvil 5SC, Validacin 3SL, 5WP...

- Đối với cây lạc, đậu đỗ: Trừ sâu cuốn lá bằng thuốc Phumai 3.6EC, Decis 2.5EC,... Trừ sâu khoang bằng thuốc Permecide 50EC, Peran 50EC...(phun vào chiều tối); phòng trừ bệnh đốm lá khi mới xuất hiện bằng thuốc Anvil 5SC, Tilt Super<sup>®</sup> 300EC...; phòng trừ bệnh héo xanh vi khuẩn bằng thuốc Bionite WP, Sapol 700WP,...; phòng trừ bệnh héo vàng bằng thuốc Ridomil Gold 68WG, Monceren 250SC, Anvil 5SC...

**2.3. Trên vải thiều, nhãn:** Kiểm tra phòng trừ bệnh sương mai, thán thư khi mới phát sinh bằng thuốc Insuran 50WG, Antracol 70WP, Melody duo 66.75WP...; trừ sâu đo bằng thuốc có nguồn gốc sinh học như nhóm Abametin, Emamectin benzoate, ...; Phun trừ bọ xít, sâu đục cuống bằng thuốc: Aremec 45EC, Tasieu 1.9EC, Luckyler 25EC, Emaben 2.0EC, 3.6WG ...;

**2.4. Trên cây có múi:** Kiểm tra phun phòng trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp, nhện... bằng thuốc: Soka 25EC, Catex 3.6EC, Radiant<sup>®</sup>60SC... hoặc các loại thuốc có hoạt chất Abamectin, Emamectin benzoate đăng ký trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp, nhện...; đối với bệnh sẹo cần vệ sinh, cắt tỉa và tiêu hủy các cành, lá, quả bị bệnh, phòng trừ bằng các loại thuốc như: Daconil 500SC, Arygreen 500SC,...; đối với bệnh loét tiến hành cắt bỏ và tiêu hủy cành, lá bị bệnh phòng trừ bằng các loại thuốc có gốc đồng hoặc kháng sinh như: Kasumin 2SL, Liberty 100WP.

**2.5. Trên cây chè:** Thường xuyên kiểm tra vườn để phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu, bệnh hại như: Phun trừ rầy xanh, bọ cánh tơ, nhện đỏ... trên vườn có mật độ cao bằng thuốc Tasieu 1.9EC, 5WG, Sokupi 0.5SL,...; trừ bọ xít

muối bằng thuốc Emaben 2.0 - 3.6WG, Dylan 2EC,..; phòng trừ bệnh phòng lá chè, chám xám, đốm nâu bằng thuốc Antracol 70WP, Manage 5WP...; phòng trừ bệnh thối búp bằng thuốc Genol 1.2SL, Actinovate 1 SP, Starone 20WP ...

Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại trên cây trồng vụ xuân trong giai đoạn hiện nay, UBND xã đề nghị cán bộ chuyên môn phối hợp với các ngành, đoàn thể, thôn tuyên truyền thực hiện tốt nội dung công văn này./.

*\* Chú ý: Sử dụng thuốc BVTV, phân bón đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.*

***Nơi nhận:***

- TT DV KTNN huyện Yên Thế;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã
- Như trên;
- Lưu: VT, KN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Đỗ Đức Thiện**